



## Appareils Fixes (BROCHES)

---

**BUT :** Les appareils fixes sont collés sur les dents pendant toute la durée du traitement. Ils permettent d'aligner les dents en modifiant leurs positions afin d'en améliorer l'apparence et le fonctionnement.

**PORT :** Il se peut que vous ressentiez un inconfort passager après la première mise en place des appareils fixes ou lors des visites d'ajustement. Il faudra un peu de temps pour vous habituer aux appareils fixes, qui risquent de gêner vos lèvres et l'intérieur de vos joues. Le cas échéant, une cire orthodontique peut être appliquée sur les boîtiers, pour la protection des tissus mous. Pour avoir moins mal après les visites d'ajustement, mangez de préférence des aliments tendres.

**ENTRETIEN :** Il faut faire des efforts supplémentaires au niveau de l'hygiène lorsqu'on porte des broches afin d'éviter les caries et les maladies de gencives. Il est recommandé de brosser ses dents à chaque repas en plus du matin et du soir avant le coucher. De plus, des explications adéquates ainsi qu'un kit d'hygiène vous seront fournis lors de l'installation.

**URGENCE :** Les problèmes pouvant vous affecter lors d'un traitement d'orthodontie sont la plus part du temps assez bénins et ne requièrent pas une attention immédiate tel un boîtier décimenté, un fil plié, une chaîne d'élastique cassée ou un espace qui se crée entre deux dents. Toutefois, un boîtier qui blesse la joue, un fil qui pique ou blesse, un fil qui se décroche, sont des problèmes un peu plus inconfortables et ou douloureux qui peuvent nécessiter un soulagement. Veuillez nous contacter immédiatement si une telle situation se présente.

**Veillez-vous référer à la section urgence pour plus d'information**